

# ＜自費診療のご案内＞

## ふくだあやレディースクリニック

初診料・診察料が別途かかります。

| 疾患   | 検査項目                              | 方法     | 検査の説明  | 検査費用<br>税込み | 大阪市の<br>検診 (税込) |
|------|-----------------------------------|--------|--|-------------|-----------------|
| がん検診 | 子宮頸がん検診                           | 細胞診    | ブラシやヘラなどで子宮頸部を優しくこすり、細胞を採取します。ほとんど痛みは無く、短時間ですみます。年一度の検診をお勧めします。  | ¥4,500      | ¥400            |
|      | 子宮体がん検診                           | 細胞診    | 子宮体がんは、40歳代後半から増加し、50歳代から60歳代にピークを迎えます。近年、子宮体がんは年齢に関係なく増加傾向にあります。子宮内腔の細胞を採取します。  | ¥4,500      | なし              |
|      | 卵巣腫瘍 子宮筋腫 などの検診                   | エコー検査  | 内診では卵巣の確認は困難です。経膈超音波を実施することにより、卵巣に異常がないか確認できます。子宮筋腫や卵巣嚢腫、子宮内膜症、ポリープもチェックできます。<br><b>子宮がん検診と一緒に行うことをお勧めします。</b>               | ¥4,000      |                 |
|      | 乳がんエコー検診                          | エコー検査  | 当院では痛みのないエコーによる乳がん検診を行っています。40代以上の女性はさらに、マンモグラフィーを併用することをおすすめします。マンモグラフィーご希望の方はお近くの病院をご紹介します。                                | ¥5,000      | 30代のみ<br>¥1000  |
|      | HPV検査                             | おりもの検査 | 子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV) というウイルスの感染により起こります。感染の有無を確認することが大事です。   | ¥5,500      | なし              |
| 感染症  | クラミジア・淋菌 (頸部)                     | おりもの検査 | クラミジアは最も多い性感染症。自覚症状がほとんどありません。放置しますと、卵管炎などを起こし腹痛・腹膜炎・不妊症の原因になります。  | ¥3,000      |                 |
|      | クラミジア・淋菌 (咽頭)                     | 咽頭ぬぐい  |  | ¥3,000      |                 |
|      | トリコモナス                            | おりもの検査 | 泡状の悪臭の強い黄色いおりものの増加と、外陰・膣の刺激感、強いかゆみを起こします。  | ¥1,200      |                 |
|      | H I V                             | 血液検査   | HIV感染症は、血液、体液（膣液、精液）等を介して感染します。妊婦さんがHIVに感染していると赤ちゃんにも感染する事があります。   | ¥3,000      |                 |
|      | 梅毒                                |        | 主として性行為（キスも含む）などで感染します。赤ちゃんに感染する事がありますが早期発見で治療を行えば赤ちゃんへの感染は防ぐことができます。ここ数年、増加傾向にあります。梅毒患者はHIVに感染しやすいのと同時にHIV感染者には梅毒が多く認められます。 | ¥2,000      |                 |
|      | H B V 抗原                          |        | 母子感染・輸血・針刺し・注射・性行為などで感染します。お母さんが感染している場合、赤ちゃんに感染することがあります。   | ¥2,000      |                 |
|      | H C V 抗体                          |        | 性行為でのC型肝炎感染は低いものの、お母さんがB型肝炎ウイルスに感染している場合、赤ちゃんに感染することがあります。   | ¥2,000      |                 |
| 風疹抗体 | 妊娠初期に風疹にかかると胎児に先天性の異常をきたすことがあります。 |        | ¥3,000   |             |                 |